

# OEDEME AIGU DU POUMON CARDIOGENIQUE

F.A.E 2022


L.VERRIER

SAMU 21 - CESU 21

Souvenons nous.....du muscle cardiaque.....et de la circulation....




Syndrome  
coronarien  
aigu



Hypertension

INSUFFISANCE  
CARDIAQUE

# OEDEME AIGU DU POUMON = OAP



## OAP - CAUSES DECLENCHANTES

- Insuffisance cardiaque due à IDM, HTA au long cours. ( moins fréquents depuis l'amélioration de pec de ces pathologies)
- Associée ou non à surinfection bronchique ou pulmonaire
- Poussée HTA
- Trouble du rythme
- Ecart de régime
- Arrêt inopiné du traitement

## **RADIOGRAPHIE PULMONAIRE DE L'OAP**



**RP NORMALE**



**PATIENT EN OAP**

**Quels signes sont  
évoqueurs d'un OAP ?**

## **OAP**

## **SIGNES CLINIQUES**

- Dyspnée: sensation d'étouffement, d'asphyxie.
- Ne supporte pas la position allongée.
- Cyanose des extrémités ou de l'ensemble du visage.
- Grésillement laryngé. . Souvent HTA
- Mousse blanche ou rosée possible au niveau de la bouche.
- Auscultation médicale: râles crépitants

## **Prise en charge SMUR**

A votre avis ?

## **PRISE EN CHARGE SMUR**

- **Position assise,**  
voir jambes pendantes, si la PA le permet.
- **O2** masque haute concentration
- Recherche d'une cause :ECG SCOPE
- VVP. Raccord multilumière


## **PRISE EN CHARGE SMUR**

### **Traitement médical**

- **Diminuer la pression artérielle :si besoin**
  - Vasodilatateurs
  - Diurétiques
- **Améliorer les échanges alvéolo-capillaires:**  
Ventilation non invasive en pression positive  
CPAP Boussignac (cf conditions)
- Tonicardiaques
- Si besoin ventilation invasive contrôlée.

# **C.P.A.P. BOUSSIGNAC**

## **Continuous Positive Airway Pressure**



Cf conditions d'utilisation



VENTILATION NON-INVASIVE



## **Fiche de mission: OAP**

**Quel matériel déplacer  
au lit du patient?**

## **Fiche de mission: OAP**

### **Que déplacer au lit du patient?**

- O2
- SCOPE – ECG
- SAC D'INTERVENTION
- POUSSE SERINGUE ELECTRIQUE
- MALETTE BOUSIGNAC, RESPIRATEUR
- MOYEN DE TRANSPORT ADAPTE

**O.A.P.**

**Transport du patient**

## **O.A.P.**

### **Transport du patient**

- La chaise est le moyen de transport idéal d'un patient conscient présentant des signes d'OAP avec une bonne hémodynamique.

## **OAP CONCLUSION**

- Urgence ++
- Décès si traitement tarde trop.
- Une prise en charge médicalisée précoce évite l'issue fatale.

