


| | | |
|---|--|--|
|  | FICHE REFLEXE AS | Date d'application : Septembre 2022 |
| | BRÛLÉ GRAVE | SAUV |
| Rédacteurs : | Vérificateurs : | Approbateur : |
| GEVAUDAN Pauline (AS) HAENN Stéphanie (IDE) PISANESCHI Manon (AS) | AUGIER Francis (FFCS) – BERTIN Frédéric (CS) Dr LAGHZAOUI Samir | Dr LAGHZAOUI Samir |


| | |
|-------------------------------------|--|
| Définitions | <p>Agression thermique, chimique, électrique ou par rayonnement des tissus.</p> <p>Stades :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>1er degré</u> (lésion superficielle de l'épiderme) : rougeur de la peau sans phlyctène, douleur • <u>2ème degré superficiel</u> (lésion jusqu'à la jonction dermo-épidermique) : phlyctène, rougeur à son fond, douleur • <u>2ème degré profond</u> (destruction de la jonction et atteinte du derme) : phlyctène, blancheur à son fond, pas de douleur • <u>3ème degré et carbonisation</u> (destruction totale du derme, atteinte de l'hypoderme et structures sous-jacentes) : aspect cartonné, couleur du blanc au noir, pas de douleur <p>SCB (Surface Corporelle Brûlée) : table de Lund and Browder/règle des 9 de Wallace (cf annexe) et/ou main du patient = 1% de la surface corporelle du patient). Le 1^{er} degré ne compte pas dans le calcul de la SCB.</p> |
| Installation Conditionnement | <ul style="list-style-type: none"> • Décubitus dorsal, 30° • Surélévation des membres inférieurs si hypotension • Surélévation des membres brûlés • Décubitus dorsal strict si IOT prévue • Déshabillage prudent du patient : demander au médecin la conduite à tenir concernant les vêtements adhérents qui se situent sur zone brûlée • Ablation des bijoux • Couverture de survie ou couverture chauffante en prévention de l'hypothermie • Monitoring du patient sur peau saine dans la mesure du possible • Mise en place d'une protection si patient incontinent : vérification toutes les 2h • Réinstallation régulière du patient : toutes les 2h • Prévention d'escarres sur peau saine |
| Surveillances | <ul style="list-style-type: none"> • État de conscience • Prise des constantes toutes les heures : PNI, FC, FR, SpO2, EN, température +/- toutes les 15min si défaillance hémodynamique • Surveillance glycémie • Surveillance diurèse horaire • Surveillance points d'appui des dispositifs d'oxygénothérapie (nez, oreilles, pommettes, cou) : mise en place d'Algoplaque si risque d'escarre |
| Pansements | <ul style="list-style-type: none"> • Asepsie +++ • Préparation et aide aux pansements en collaboration avec l'IDE : gants stériles, champs stériles, set à pansement, eau stérile, Flammazine, tulle gras, bandes, sparadrap • Lavage des plaies à l'eau stérile et emballage dans champs stériles si transfert vers centre de grands brûlés |

ANNEXE

Table de Lund et Browder



Règle des 9 de Wallace



| | NN | 1 an | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Adulte |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| A | 9 1/2 | 8 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| B | 2 1/4 | 3 1/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 1/4 |
| C | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 |