FICHE REFLEXE IDE

Date d'application :
Août 2022**BRÛLÉ GRAVE**

SAUV

Rédacteur :

Vérificateurs :

Approbateur :

ROUXEL Clément (IDE)

AUGIER Francis (FFCS) – BERTIN Frédéric (CS)
Dr LAGHZAoui Samir

Dr LAGHZAoui Samir

Définitions	<p>Agression thermique, chimique, électrique ou par rayonnement des tissus.</p> <p>Stades :</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>1er degré</u> (lésion superficielle de l'épiderme) : rougeur de la peau sans phlyctène, douleur• <u>2ème degré superficiel</u> (lésion jusqu'à la jonction dermo-épidermique) : phlyctène, rougeur à son fond, douleur• <u>2ème degré profond</u> (destruction de la jonction et atteinte du derme) : phlyctène, blancheur à son fond, pas de douleur• <u>3ème degré et carbonisation</u> (destruction totale du derme, atteinte de l'hypoderme et structures sous-jacentes) : aspect cartonné, couleur du blanc au noir, pas de douleur <p>SCB (Surface Corporelle Brûlée) : table de Lund and Browder/règle des 9 de Wallace (cf annexe) et/ou main du patient = 1% de la surface corporelle du patient). Le 1^{er} degré ne compte pas dans le calcul de la SCB.</p> <p>Principes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Un patient brûlé est conscient sauf intoxication au CO ou TC• Un patient brûlé est stable sauf intoxication aux cyanures et/ou polytraumatisme
Gravité	<p>Terrain : âges extrêmes de la vie, comorbidités (insuffisance respi, cardiaque, rénale, diabète)</p> <p>Stade : 2ème degré profond et 3ème degré</p> <p>Surface : >20% ou >5% dans le 3ème degré, >10% dans les âges extrêmes de la vie</p> <p>Localisation : à risque fonctionnel profond : face/cou/voies respiratoires, périnée</p> <p>Lésions associées : intox au CO, intox aux cyanures, lésions traumatiques (blast)</p>
Prise en charge	<p>Conditionnement :</p> <ul style="list-style-type: none">• Déshabillage du patient, retrait prudent des vêtements avec cooling à l'eau stérile, retrait des bijoux• Surélever les membres brûlés• Scope avec température (SAD thermique si hypothermie)• VVP sur peau saine, 2 VVP dont une avec octopus si SCB >20%• SAD pour surveillance diurèse (0.5 ml/kg/h)• Couverture survie ou chauffante si hypothermie <p>Traitements :</p> <ul style="list-style-type: none">• Oxygénothérapie avec objectif saturation > 92%• Remplissage NaCl 0.9% ou Ringer Lactate (Formule de Parkland : 20mL/kg la 1ère heure puis 1-2mL/kg/SCB de H1 à H8)• Analgésie : Perfalgan, Morphine, Kétamine• Pansements :<ul style="list-style-type: none">• Si évacuation rapide : nettoyage eau stérile + champs stériles en protection• Si pas d'évacuation : lavage à l'eau stérile, Flammazine, Jelonet et pansement stérile <p>Examens complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none">• NFS, Iono, Coag, GDS, Lactates, HbCO, Groupe/RAI• Scanner/radios <p>Facteurs à prendre en compte :</p> <ul style="list-style-type: none">• Asepsie +++• IOT (anticiper) si hyperalgique, trouble de la conscience, brûlures cervico-faciales, détresse respiratoire• KT osseux ou VVC si échec à la pose de VVP

Sources: Check-list de traitement d'un brûlé grave adulte en milieu préhospitalier et aux urgences (SFAR)

ANNEXE

Table de Lund et Browder

Règle des 9 de Wallace

	NN	1 an	5 ans	10 ans	15 ans	Adulte
A	9 1/2	8 1/2	6 1/2	5 1/2	4 1/2	3 1/2
B	2 1/4	3 1/4	4	4 1/4	4 1/2	4 1/4
C	2 1/2	2 1/2	2 1/2	3	3 1/4	3 1/2