PENETRATION DES PARTICULES

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

PARTICULE (E = 1 MeV)	AIR	EAU	BETON	PLOMB
α	0,5 cm	8 μm	–	1 μm
β	2,9 m	4 mm	–	0,35 mm
Photon γ (<u>demi- absorption</u>)	150 m	15 cm	6 cm	1,5 cm

RAYONNEMENT PAR APPORT D'ENERGIE

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

- **Rayons X** = photons provenant des électrons (arrachés de la cathode chauffée) percutant l'anode.
- **Effet ON/OFF** $\Rightarrow$ **protection uniaquement si ON**

Tube à rayons X

SOURCES RADIOACTIVES SCELLEES / NON SCELLEES

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

- **Scellées** = **non dispersables** (ex : radiothérapie externe / cobalt 60 = source 2cm x 5 mm, radiostérilisation, ...)
- **Non scellées** = **dispersables** (ex : scintigraphie, I131 = TTT du Kc thyroïdien, ...)

FISSION

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

• $U235 + n = :$

- soit pas de fission $\Rightarrow$ transuraniens (Ex : Pu239, U238 : émetteurs α)
- soit fission $\Rightarrow$ radionucléïdes de n°atomique $<$ (Ex : iode, césium, strontium : émetteurs β et γ)
+ E + 2 ou 3 n

• Ces neutrons sont :

- soit neutralisés (par du cobalt) sauf un $\Rightarrow$ réaction en chaîne contrôlée = principe d'une centrale nucléaire
- soit non neutralisés $\Rightarrow$ réaction en chaîne non contrôlée = principe d'une arme nucléaire

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

FUSION

- $H_2 + H_3 = He + E$
- Possible uniquement à une température de plusieurs millions de degrés
- θ° obtenue par un **détonateur à fission** qui sert d'amorce à la réaction de fusion
- Principe des armes thermonucléaires et des centrales du futur (à l'étude)

EVALUATION DES DOSES

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

- **Les fortes doses sont exprimées en gray (Gy)** correspondant à la dose absorbée = énergie déposée / masse.
- **Les faibles doses ($< 1 \text{ Gy}$) sont exprimées en sievert (Sv)** correspondant à la dose absorbée $\times W_r$ (« toxicité » du rayonnement, variant de 1 (β, γ) à 20 (α)).

MODALITES D 'ATTEINTE

- **IRRADIATION EXTERNE** :
 - **exposition** à distance d'une source
 - cesse dès l'arrêt de l'exposition.
 - **victime non contaminée et donc non contaminante**
- **CONTAMINATION EXTERNE** :
 - **dépôt** de radioéléments sur la victime
 - **victime contaminante jusqu'à la décontamination externe**
- **CONTAMINATION INTERNE** :
 - **pénétration** de radioéléments dans l'organisme souvent **associée à une contamination externe**
 - **victime contaminante jusqu'à la décontamination externe**
 - Victime contaminée jusqu'à élimination de la contamination

EXPOSITIONS PARTIELLES

- **Peau et derme :**
 - érythème, épidermite, phlyctènes, nécroses
 - **érythème précoce et fugace (lères heures) = > 5 Gy**
- Autres organes :
 - malformations congénitales
 - stérilité
 - cataracte
 - **parotidite aiguë dans les 12 heures (> 5 Gy)**

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

EXPOSITIONS GLOBALES

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

Dose (Gy)	Phase initiale	Phase de latence	Phase d'état	Evolution	Signes biologiques	Prise en charge
0,5 à 1					Lymphopénie transitoire	Médecin traitant
1 à 2	Nausées, Vomissements Céphalées < 3 h (25% des sujets)			Guérison spontanée	Lymphopénie puis pancytopénie modérée et transitoire	Hospitalisation médecine interne
2 à 5	Nausées Vomissements Céphalées Diarrhées < 3 h	15 jours	Manifestation d'aplasie médullaire	Guérison sous traitement	Lymphopénie profonde puis aplasie médullaire	Hospitalisation service hématologie
5 à 10	Nausées Vomissements Diarrhées (fièvre) < 1 h	< à la semaine	Syndrome digestif puis hématologique Possible défaillance multiviscérale	Guérison sous traitement ?	Lymphopénie profonde puis aplasie médullaire Troubles hydro-électrolytiques	Service hématologique ou service des brûlés
10 à 15	Nausées Vomissements Diarrhées Fièvre Syncope-obnubilation en qq minutes	Transitoire et incomplète	Syndrome pulmonaire, digestif...	Issue fatale probable	Lymphopénie profonde Troubles hydro-électrolytiques	Réanimation hématologique ou service des brûlés
> 15	Nausées Vomissements Diarrhées Fièvre Syncope-obnubilation Coma rapide	Absence	Syndrome neurologique central rapidement fatal	Issue fatale	Lymphopénie profonde	Réanimation

TTT MEDICAL = DECONTAMINATION INTERNE

- ↓ de l'absorption digestive par **adsorption** : Gaviscon®
- ↓ de l'absorption digestive par **insolubilisation** : insolubilisation du césium par bleu de prusse
- **Chélation** : par DTPA injectable ou inhalé (élimination urinaire)
- **Dilution isotopique** : I131 par iode stable dans les six heures suivant la contamination, eau tritiée par apport massif de boisson
- **Saturation** = précédent en préventif

Centre
d'Enseignement
des Soins
d'Urgence
21

NATURE DU RISQUE

- **Naturel** = maladies **émergentes** (SARS, H5N1) ou **résurgentes** (Ebola, Hanta, West Nile, Chikungunya, ...)

- **Technologique** (industriel, militaire ou terroriste) :

Биопрепарат

(Biopreparat)

Nicolai Ustinov, Kanatjan Alibekov, Alexander Lebed, Sverdlovsk, Stepnogorsk, Novossibirsk