



Centre  
d'Enseignement  
des Soins  
d'Urgence  
21

# A.F.G.S.U. 1

Arrêté du 16 mars  
2021 modifiant  
l'arrêté du 30  
décembre 2014


## CESU 21



## - NOTES -



# ALERTE = 15



Si victime, on  
appelle toujours

**le 15 !!!!**



### Le message d'alerte

**Se présenter** : profession: médical, paramédical

**Lieu** : ville n° rue, digicode, sens autoroute, PK, lieu-dit ....

**Type de problème** : Accident, maladie ...

**Nombre de victimes** :

**Type de victime**: enfants, adultes, personnes âgées

**État apparent des victimes** : conscience, respiration, hémorragie ....

**Gestes effectués** : compressions thoraciques externes, gairrot, PLS...

**Risques environnants persistants**: feu, produits chimiques, ....

**Ne pas raccrocher sans y avoir été invité**

S.D.I.S.



S.M.U.R.



S.A.M.U. - CENTRE 15



CENTRE DE RECEPTION ET REGULATION DES APPELS



CONSEIL MEDICAL



MEDECIN LIBERAL



AMBULANCE AGREEE

## LEXIQUE



RCP = réanimation cardio-pulmonaire

DAE = défibrillateur automatique externe

PLS = position latérale de sécurité

SAMU = service d'aide médicale urgente


SMUR = structure mobile d'urgence et réanimation

SDIS = service départemental d'incendie et de secours



Pour toute information complémentaire,  
contacter le CESU : 03.80.29.37.38

# Une personne ne va pas bien: Algorithme décisionnel



**DAE** Mis en place sans arrêter les compressions


-Si **ventilation**: 30/2

Chez enfant débiter par 5 ventilations




## REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE DE BASE DE L'ADULTE AVEC D.A.E.

ERC Guidelines, 2010



# LES COMPRESSIONS THORACIQUES EXTERNES



## LES BRULURES

### Règle des quatre 15


- Refroidir 15 minutes
- Eau à 15°C
- A 15 cm de la plaie
- +/- appel au 15

Donner information sur cause et aspect:  
étendue, rougeurs, cloques, cloques rompues, aspect blanc...



# LES TRAUMATISMES OSTEO - ARTICULAIRES

- Interroger pour comprendre le mécanisme
- Rechercher impotence fonctionnelle, observation
- Interroger sur les traitements en cours
- Recherche de complications vasculo-nerveuses: coloration, pouls périphérique, sensibilité, motricité
- Immobilisation
- Glace
- **Appel au 15**



CESU 21- janvier 2013

## LE DEFIBRILLATEUR

- .. Ouvrir la pochette du défibrillateur cardiaque
- 2► Mettre en marche l'appareil en appuyant sur ON
- 3► Se laisser guider par l'appareil :
  - Dénuder la poitrine du patient et ouvrir l'emballage contenant les électrodes ; raser ou sécher le torse si besoin
  - Positionner les électrodes comme indiqué sur l'emballage, sans jamais interrompre les CTE
  - Brancher le connecteur
- 4► Ne pas toucher le patient. L'appareil analyse le rythme cardiaque et propose, la délivrance d'un choc électrique, si cela est nécessaire.
- 5► Dès que cette opération est terminée, vous pouvez à nouveau toucher le patient : reprendre la RCP (réanimation cardio-pulmonaire).  
Si pas de choc indiqué : vérifier la respiration et si absente reprendre la RCP




### Précautions d'emploi :

- raser les poils
- sécher la peau
- pas de contact avec du métal
- enlever tout patch du torse
- ne jamais décoller puis recoller les électrodes
- Ne jamais éteindre le défibrillateur

CESU 21- janvier 2013

# LA POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ



## OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES SUPÉRIEURES

### OBSTRUCTION COMPLETE

- Mains à la gorge
- Rouge
- Ne parle pas
- Ne tousse pas
- **Ne respire pas**

**AUCUN  
BRUIT**



- 5 tapes entre les deux omoplates
- 5 compressions abdominales

- Appel 15

### OBSTRUCTION PARTIELLE

- Panique
- Parle
- Tousse +++
- **Respire**



- Ne pas essayer d'extraire le corps étranger
- Rassurer
- Oxygénation MHC (si possible)

- Appel 15